

## Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия (CIDP)



Хронический	- затяжной
Воспалительный	- воспалительный
Демиелинизирующий	- деградация миелиновой оболочки нервов
Поли-невропатия	- заболевают многие нервы

CIDP (хроническая форма СГБ) развивается медленно в течение нескольких месяцев. Это обычно начинается с симптомов на ногах, ногах, руках и руках. Пострадавшие чувствуют постепенно усиливающуюся слабость.

CIDP является аутоиммунным заболеванием, при котором защитная система организма атакует нервы. Поражается периферическая нервная система. Миелиновые оболочки, являющиеся важной частью нервов, воспалены и подвержены разрушению. Соответствующие нервы больше не могут передавать стимулы, которые влияют на мышцы и чувствительность.

### Следующие жалобы могут возникнуть:

- Потеря коленных и голеностопных рефлексов.
- Боль, онемение и дискомфорт.
- Трудности при ходьбе, трудности при подъеме по лестнице и подъем со стула или кресла.
- Проблемы управления движениями и их координации. Походка становится широкой, шаткой и не уверенной. Это расстройство моторики может также быть единственным симптомом. Это часто происходит у детей.
- Паралич на руках, руках, ступнях и ногах.
- тремор (дрожание)
- Ограничение мелкой моторики и осязания.
- Нарушенное ощущение температуры.
- Двойные изображения, нарушения глотания или слуха.
- Мочевой дискомфорт.

Иногда CIDP наступает так же внезапно, как GBS. Однако без медицинского содействия вместо улучшения, как с GBS, оно обостряется. Диагностика CIDP сложна и может занять время. Симптомы очень различны и могут сбивать с толку как пациента, так и врача. Первые симптомы, такие как усталость и нарушение чувствительности должны находиться под наблюдением. За ними следуют покалывание, онемение, истощение или слабость. Это обычно начинается в пальцах рук и ног. Состояние ухудшается в течение нескольких недель. Без терапии степень слабости продолжает увеличиваться. В редких случаях это приводит к обширному параличу.

Есть много разных историй протекания CIDP. Некоторые пациенты переживают болезнь как постепенный процесс. Другие испытывают резкие периодические ухудшения. Существует форма болезни, которая имеет только сенсорные (чувственные) нарушения в качестве симптомов.

Симптомы CIDP могут увеличиваться быстро или медленно. Эффекты могут быть очень разные. У некоторых пациентов могут быть едва какие-либо заметные нарушения, в то время как другим приходится жить с жесткими ограничениями.

В зависимости от конкретного случая, CIDP лечат иммуноглобулинами, плазмаферезом, кортизоном и иммунодепрессантами. Невропатическую боль можно лечить с помощью противосудорожных препаратов или трициклических антидепрессантов. В борьбе с CIDP важны физиотерапия, трудотерапия и логопедия. Они помогают улучшить или поддерживать физические возможности пациента.

Хронические варианты невропатий включают синдром Льюиса Самнера (MADSAM) и мультифокальную моторную невропатию (MMN).